

## طریقه میکرو لایز کردن گردو و بادام

میزان مصرف	نحوه مصرف	نوع کود	زمان مصرف
۵۰-۱۰۰ گرم هر درخت	همراه آبیاری	Microlize NPK ۱۰-۵۲-۱۰	پس از بیدار شدن جوانه‌ها
۱ کیلو در هزار لیتر آب	محلول پاشی	Microlize Fruit Set	تورم جوانه
۱ لیتر در هزار لیتر آب		Microlize Ca + B Chelate	
۵۰-۱۰۰ گرم هر درخت	همراه آبیاری	Microlize NPK ۲۰-۲۰-۲۰	پس از تشکیل میوه
۵۰-۱۰۰ گرم هر درخت		Microlize NPK ۱۵-۵-۳۰	
۴۰-۶۰ گرم هر درخت		Microlize Gold	
۱ لیتر در هزار لیتر آب	محلول پاشی	Microlize Ca Chelate ۱۴%	همزمان با رشد میوه‌ها
۲ کیلو در هزار لیتر آب		Microlize Zn Chelate ۲۰%	
۵۰-۱۰۰ گرم هر درخت	همراه آبیاری	Microlize NPK ۱۲-۱۲-۳۶	
۲ کیلو در هزار لیتر آب	محلول پاشی	Microlize Gold	
۲ کیلو در هزار لیتر آب		Microlize K ۳۵%	
۱ لیتر در هزار لیتر آب		Microlize Ca Chelate ۱۴%	

\*در مراحلی که محلول پاشی توصیه شده است حداقل تکرار ۲ مرتبه می‌باشد.



تورم جوانه

گلدهی

میوه



تورم جوانه

گلدهی

میوه

مراحل رشدی بادام و گردو