

طریقه میکرولایز کردن انار

زمان مصرف	نحوه مصرف	نوع کود	میزان مصرف
هنگام تورم جوانه	محلول پاشی	Microlize Fruit Set	۱ کیلو در هزار لیتر آب
		Microlize Ca + B Chelate	۱ لیتر در هزار لیتر آب
ابتدای گلدهی	محلول پاشی	Microlize NPK ۲۰-۲۰-۲۰	۳-۵ کیلو در هزار لیتر آب
		Microlize Zn Chelate ۱۵%	۲ لیتر در هزار لیتر آب
بعد از تشکیل میوه	همراه آبیاری	Microlize NPK ۲۰-۲۰-۲۰	۵۰-۱۰۰ گرم هر درخت
		Microlize Gold	۴۰-۶۰ گرم هر درخت
درشت شدن و رنگ گیری میوه	محلول پاشی	Microlize Fe Chelate ۶%	۲ کیلو در هزار لیتر آب
		Microlize NPK ۱۲-۱۲-۳۶	۳-۵ کیلو در هزار لیتر آب
	محلول پاشی	Microlize Gold	۲ کیلو در هزار لیتر آب
		Microlize Mg Chelate ۷ %	۲ کیلو در هزار لیتر آب
قبل از برداشت	محلول پاشی	Microlize Ca Chelate ۱۴%	۱ لیتر در هزار لیتر آب
بعد از برداشت	محلول پاشی	Microlize Fruit Set	۱ کیلو در هزار لیتر آب

* در مراحلی که محلول پاشی توصیه شده است حداقل تکرار ۲ مرتبه می‌باشد.



تورم جوانه



گلدهی



تشکیل میوه



میوه نارس



میوه رسیده

مراحل رشدی انار