

طریقه میکرولایز کردن خرما

زمان مصرف	نوع کود	نحوه مصرف	میزان مصرف
قبل از گلدهی	P ^{۴*}	همراه آبیاری	۱-۱/۵ کیلوگرم برای هر درخت
	Microlize K ۳۵%		۳۰-۶۰ گرم هر درخت
	Microlize N ۳۰ %		۴۰-۸۰ لیتر در هکتار
	Microlize Zn Chelate ۲۰%		۳۰-۶۰ گرم هر درخت
تشکیل و فرم گیری میوه	Microlize NPK ۱۲-۱۲-۳۶	همراه آبیاری	۵۰-۱۰۰ گرم هر درخت
	Microlize Gold		۴۰-۶۰ گرم هر درخت
	Microlize Fe Chelate ۱۴,۵%		۵۰-۷۰ گرم هر درخت
	Microlize Ca Chelate ۱۴%	محلول پاشی	۱ لیتر در هزار لیتر آب
بعد از برداشت	Microlize NPK ۲۰-۲۰-۲۰	همراه آبیاری	۵۰-۱۰۰ گرم هر درخت

* در مراحل که محلول پاشی توصیه شده است حداقل تکرار ۲ مرتبه می باشد.



رشد رویشی

گلدهی و تشکیل میوه

میوه نارس

قابل برداشت

مراحل رشدی خرما