

طریقه میکرو لایز کردن مرکبات

زمان مصرف	نوع کود	نحوه مصرف	مقدار مصرف
شروع رشد شاخه‌ها	Microlize NPK ۲۰-۲۰-۲۰	همراه آبیاری	۲۰ کیلو گرم در هکتار
	Microlize Humic acid		۸ کیلو گرم در هکتار
قبل از گلدهی	Microlize Fruit Set	محلول پاشی	۱ کیلو در هزار لیتر آب
	Microlize Humic acid		۲ کیلو در هزار لیتر آب
بعد از تشکیل میوه	Microlize N ۳۰ %	همراه آبیاری	۱۵ لیتر در هکتار
	Microlize Gold		۲ کیلو در هزار لیتر آب
فندقی شدن میوه	Microlize NPK ۲۰-۲۰-۲۰	همراه آبیاری	۱۵ کیلو در هکتار
	Microlize ۴-۴-۶	محلول پاشی	۲ کیلو در هزار لیتر آب
	Microlize Ca Chelate ۱۴%		۱ لیتر در هزار لیتر آب
	Microlize NPK ۱۰-۱۰-۴۰		۱۵ کیلو در هکتار
بعد از گردویی شدن	Microlize Humic acid	همراه آبیاری	۸ کیلو در هکتار
	Microlize Fe Chelate ۱۴,۵%		۲ کیلو در هزار لیتر آب
	Microlize Ca Chelate ۱۴%	محلول پاشی	۱ لیتر در هزار لیتر آب
	Microlize NPK ۱۰-۱۰-۴۰	همراه آبیاری	۱۰ کیلو در هکتار
۲ ماه قبل از برداشت	Microlize Ca Chelate ۱۴%	محلول پاشی	۱ لیتر در هزار لیتر آب
	Microlize K ۳۵%	همراه آبیاری	۶ کیلو گرم در هکتار
قبل از رنگ انداختن	Microlize Ca Chelate ۱۴%	محلول پاشی	۱ لیتر در هزار لیتر آب
	Microlize Fe Chelate ۱۴,۵%		۱ کیلو در هزار لیتر آب
	Microlize Mn Chelate ۱۶%		۵۰۰ گرم در هزار لیتر آب
	Microlize Fruit Set	محلول پاشی	۱ کیلو در هزار لیتر آب
پس از برداشت	Microlize Humic acid		۲ کیلو در هزار لیتر آب

* در مراحل که محلول پاشی توصیه شده است حداقل تکرار ۲ مرتبه می‌باشد.



گلدهی



فندقی شدن



گردویی شدن



شروع رنگ انداختن



میوه رسیده

مراحل رشد مرکبات